

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa w pierśnicy [cm]/ pow. krzewów	Średnica korony drzewa	Wysokość [m]	Opis
1	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;
2	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;
3	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;
4	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	2 x 2 m	-	1,8	stan dobry z niewielką ilością suchych gałęzi;
5	Trzmielina pospolita	Euonymus europaea	35, 41, 50	4	4,5	stan średni, 40 cm od nasady pnia widoczna dziupla z rozpoczętym procesem próchnicznym na wys. 50 cm rozwidlenie "V" kształtne umożliwiające zbieranie się wody i humusu; grozi wywrotem; egzemplarz zniekształcony, silnie zaatakowany przez mszyce, widoczne popękane konary;
6	Wiśnia sp.	Prunus sp.	74	5	8	stan dobry, pień silnie wychylony na wschód, liczne odrosty korzeniowe, silnie zaatakowany przez mszyce, egzemplarz zniekształcony zatracił naturalną formę, egzemplarz nie jest wartościowy dendrologicznie;
7	Świerk biały 'Conica'	Picea abies 'Conica'	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,4	stan dobry, nie stanowi cennego egzemplarza;
8	Świerk biały 'Conica'	Picea abies 'Conica'	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,4	stan zły, uschnięty w około 40 %;
9	Bukszan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,4	stan zły, część krzewu uschnięta;
10	Bukszan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,4	stan zły, znaczna część krzewu sucha;
11	Bukszan wieczniezielony	Buxus sempervirens	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,4	stan zły, egzemplarz od dołu uschnięty;
12	Ligustr pospolity	Ligustrum vulgare	1,5 m <sup>2</sup>	-	1	stan zły, rzadkie ugałęzienie, nie stanowi cennego egzemplarza;
13	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	87, 78	6	12	stan średni, silne odrosty korzeniowe; rośnie w nawierzchni z płyt betonowych; dwa pnie zrosnięte u nasady; jeden z pni od północy na wysokości 1 m do 1,6 m ma zdartą korę, która zaczyna się odszepiać od pnia, wyżej widoczne kolejne uszkodzenia pnia;

14	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	259	10	20	stan średni, egzemplarz rośnie w płytach betonowych pochylony na południe, liczny posusz, odrosty korzeniowe;
15	Klon tatarski	Acer tataricum	115	6	8	stan średni, egzemplarz zaatakowany przez chorobę na liściach widoczne zeschnięte końce pędów, odrosty korzeniowe oraz pniowe; nieliczny posusz w koronie, występują odrosty;
16	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	6 m <sup>2</sup>	-	4	stan dobry, nieliczne suche gałęzie;
17	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	3 m <sup>2</sup>	-	4,5	stan dobry, widoczne powyłamywane konary, niewielka ilość posuszu w koronie, odrosty korzeniowe;
18	Jaśminoweic wonny	Philadelphus coronarius	0,8 m <sup>2</sup>	-	3	stan dobry; nie ma dużej wartości dendrologicznej ani wizualnej;
19	Śliwa mirabelka	Prunus domestica subsp. syriaca	70	5	4	stan średni; silnie wychylony na wschód; liczne odrosty korzeniowe i pniowe oraz ślady po wyciętych konarach, rośnie blisko fundamentu budynku toalety, silnie zaatakowany przez mszyce, duża ilość posuszu w koronie;
20	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	ok. 300 cm (brak dostępu niemożliwy pomiar)	8	20	stan dobry, u nasady pnia wyrasta podrost bzu czarnego, duża ilość posuszu w koronie, ; pomiędzy pniem a elewacją budynku nagromadzone suche liście;
21	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	5 m <sup>2</sup>	-	1,5	stan dobry, liczne odrosty korzeniowe, niewielka ilość posuszu w koronie;
22	Cis pospolity	Taxus baccata	40 m <sup>2</sup>	-	5	stan dobry; konary silnie porozkładane, widoczne uschnięte konary, młode pędy silnie poprzrastane chwastami, od zachodu wyrasta jałowiec;
23	Jaśminoweic wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, egzemplarze przycięte były na wys. 20cm, aktualnie widoczne jednoroczne pędy, egzemplarz bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
24	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;

25	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
26	Bez czarny	Sambucus nigra	37, 66, 17, 49, 26, 40, 38, 43, 24	9	4	stan średni, malowniczy egzemplarz z rozłożystą koroną, dość duża ilość posuszy w koronie, widoczne suche duże konary oraz widoczne cięcie na grubych konarach;
27	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
28	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
29	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	0,5 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
30	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m2	-	0,4	stan średni, przycięta na wysokość 20 cm, widoczne już jednoroczne pędy do 30-40 cm wysokości, bez wartości dendrologicznej i wizualnej;
31	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	219	10	20	stan dobry, egzemplarz wyrasta z nawierzchni betonowej; odrosty na pniu, korona zdeformowana;
32	Topola czarna 'Italica'	Populus nigra 'Italica'	265	10	20	stan dobry egzemplarz w dobrym stanie zdrowotnym, z widocznymi silnymi cięciami dużych konarów po zredukowaniu korony; jemiola na gałęziach; liczne odrosty pniowe;
33	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63	4	4,5	stan średni egzemplarz zdeformowany, wyłamany jeden z głównych konarów, minimalna wartość dendrologiczna i wizualna;
35	Jałowiec pośredni	Juniperus x pfitzeriana	4 m <sup>2</sup>	-	1,5	stan średni, egzemplarz zrosnięty z cisem;
36	Klon ginnala	Acer ginnala	82, 88, 92, 88, 76, 70	dokładny zasięg korony przedstawiony został na rysunku	11	stan bardzo dobry; egzemplarz bezwzględnie do zachowania; wielopniowy, rozłożysty 6 pni, jeden z nich ucięty na wysokości 1,5 m do usunięcia; należy usunąć odrosty korzeniowe i pniowe (w miarę możliwości podwyższyć koronę); egzemplarz atrakcyjny oraz cenny wizualnie; Egzemplarz ma ogromną wartość dendrologiczną jak i estetyczną jest także w bardzo dobrym stanie zdrowotnym;

37	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	115	7	15	stan dobry; widoczna spora ilość posuszu w koronie, stanowi niejako konkurencję dla klona;
38	Klon ginnala	Acer ginnala	47, 43	6	3,5	stan średni, oba konary silnie wychylone w kierunku północnym, widoczny posusz w koronie oraz odrosty korzeniowe, na obu pniach widoczne pęknięcia oraz ubytki kory, widoczne procesy próchnicze;
39	Lilak pospolity	Syringa vulgaris	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
40	Lilak chiński	Syringia chinensis	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
41	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
42	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
43	Cis pospolity	Taxus baccata	1 m <sup>2</sup>	-	1	stan dobry,
44	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	3 m <sup>2</sup>	-	1,5	stan zły, silnie zredukowany przez mszyce, sporo posuszu egzemplarz o znikomej wartości;
57	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	80, 79, 28	5	6	stan średni, trzypniowy, egzemplarz wychylony na zachód, silnie zaatakowany przez mszyce, korona asymetryczna, duża ilość posuszu w koronie, u nasady widoczne zagłębienie pomiędzy stykiem konarów umożliwiające zbieranie się wody i humusu, obtarcia na pniu;
61	Lilak chiński	Syringa chinensis	1 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
62	Tawuła van Houtte'a	Spirea x vanhouttei	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
63	Suchodrzew zwyczajny	Lonicera xylosteum	1 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
67	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
68	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	1 m <sup>2</sup>	-	1,2	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
69	Suchodrzew zwyczajny	Lonicera xylosteum	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
70	-	-	-	-	-	nasada wyciętego krzewu
71	Lilak chiński	Syringa chinensis	0,3 m <sup>2</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
72	Lilak chiński	Syringa chinensis	0,3 m <sup>3</sup>	-	0,5	stan średni, przycięty przy ziemi na wys. 20cm;
73	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	74, 65	8	5,5	stan dobry egzemplarz silnie wychylony w stronę północną, sporo posuszu w koronie, rozwidlenie "V" kształtne na wys. 50 cm;
74	Cis	Taxus sp.	19, 20, 31, 36, 31, 27, 23, 23, 31, 42, 33	8	4	stan dobry; egzemplarz wielopniowy, rozłożysty, widoczna nasada pnia;
75	Cyprysik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	33	1	3	stan zły;

76	Klon ginnala	Acer ginnala	75	8	5	stan średni; egzemplarz mocno pochylony na północ, widoczne odrosty na głównym pniu;
77	Cis pospolity	Taxus baccata	67	5	4,5	stan bardzo dobry, jeden pień, atrakcyjny egzemplarz wizualnie, wychylony pień;
78	Cis pospolity	Taxus baccata	30, 32, 31, 33, 35, 32, 30, 33, 32	4	6,5	stan bardzo dobry; wielopniowy, niewielka ilość posuszu;
79	Suchodrzew	Lonicera sp.	25, 26, 18, 24	5	4,5	stan średni, dużo posuszu, egzemplarz wyłamujący się;
80	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	78	8	5,5	stan średni; egzemplarz pochylony w stronę północy, silnie zaatakowany przez mszyce;
82	Forsycja pośrednia	Forsythia x intermedia	0,5 m <sup>2</sup>	-	1	stan dobry, przycięty przy ziemi na wys. 20cm; jednoroczne, jasnozielone pędy, nie stanowi wartości wizualne ani dendrologicznej;